

舒必利 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E8_88_92_E5_BF_85_E5_88_A9_c22_311099.htm 药品名称舒必利药物别名硫苯酰胺、舒宁、止吐灵、消呕宁，DOGMATIL，EQUILID 英文名称SulPiride 类别其他抗精神病药性状白色或类白色结晶性粉末；无臭，味微苦。在乙醇或丙醇中微溶，在氯仿中极微溶解，在水中几乎不溶；在氢氧化钠溶液中极易溶解。熔点177~180。制剂片剂：每片100mg。注射液。每支50mg（2ml）；100mg（2ml）。分子式成分药理及应用（1）止吐作用 为中枢性止吐药，有很强的止吐作用。口服比氯丙嗪强166倍，皮下注射时强142倍；比甲氧氯普胺强5倍。（2）抗精神病作用 抗木僵、退缩、幻觉、妄想及精神错乱的作用较强，并有一定的抗抑郁作用。无催眠作用。用于治疗呕吐、精神分裂症及慢性退缩和幻觉妄想病、官能性抑郁和疑病状态、酒精中毒性精神病、智力发育不全伴有人格障碍、胃及十二指肠溃疡、眩晕、偏头痛等。用法用量（1）治疗呕吐口服，每日600~1200mg。（2）治疗精神病口服，1日100~800mg，分次服。开始每日口服300~600mg，1周内增至600~1200mg。肌肉注射，1日200~600mg，分两次注射。静脉滴注，1日300~600mg，稀释后缓慢滴注，滴注时间不少于4小时。一般以口服为主，对拒药者或治疗开始1~2周内可用注射给药，以后改为口服。注重事项（1）增量过快时，可有一过性心电图改变、血压升高或降低、胸闷、脉频等，应注重。（2）有时可见轻度的锥体外系反应，应减少剂量或合用抗震颤麻痹药。（3）尚可有月经异常、泌乳、射精不能、体重增加、失眠、焦躁、不安、兴奋、困倦、口渴、头痛、

发热、出汗、排尿困难、运动失调、胃肠道反应等副作用。

(4) 如出现皮疹、瘙痒等过敏反应，应停药。(5) 本药对孕妇及新生儿的安全性尚未肯定，应慎用。(6) 用药期间不可从事伴有机械运转的危险性操作。(7) 幼儿禁用。严重心血管疾患、低血压者和肝功能不全者慎用。(8) 嗜铬细胞瘤患者禁用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com