

阿法双酮 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E9_98_BF_E6_B3_95_E5_8F_8C_E9_c22_311120.htm 药品名称阿法双酮药物别名安泰酮，爱舒新，Althesin 英文名称Alphadione 类别静脉麻醉药分子式成分药理及应用为新型固醇类麻醉药，由阿法沙龙（ α -羟孕双醇，Alphaxalone）和阿法多龙（乙酯羟孕双酮，Alphadolone Acetate）组成，阿法沙龙（化构如上）起麻醉作用，阿法多龙起助溶作用。阿法双酮的麻醉迅速，静注后半分钟入睡，5~10分钟意识消失；麻醉持续短暂约5~25分钟，视剂量大小而定；清醒舒适，意识迅速清醒。其镇痛作用不强，与肌松药无协同作用。对呼吸和循环系统的抑制作用不大，静注后有一过性血压下降。对肾上腺素引起的心律失常有拮抗作用。在体内主要被肝灭活。可用于全麻的诱导、短小手术及外科处置，或作为其他全麻的辅助药。不适用于有强烈疼痛手术的麻醉。用法用量用其注射剂，每ml含阿法沙龙9mg和阿法多龙3mg。首次剂量按0.05~0.1ml/kg，于1分钟左右静注完毕，维持量为首次剂量的1/2。注重事项最主要的缺点为过敏反应发生率很高。严重肝功能不全者及孕妇禁用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com