

盐酸金刚烷胺 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E7_9B_90_E9_85_B8_E9_87_91_E5_c22_311148.htm 药品名称盐酸金刚烷胺
药物别名金刚胺，三环癸胺 Adamantane，Amantadine 英文名称 Amantadine Hydrochloride 类别抗震颤麻痹药制剂片剂或胶囊剂：100mg；糖浆剂：5ml：5mg。药理毒理进入脑组织后可促进释放多巴胺，或延缓多巴胺的代谢而发挥抗震颤麻痹作用。对震颤麻痹有明显疗效，缓解震颤、僵直效果好。起效快用药后48小时作用明显，对多种炎症、败血症、病毒性肺炎等与抗生素合用退热作用好。药动学口服T_{max}约4h，T_{1/2}为24h，大部分以原形经肾脏排泄，也经乳汁分泌。适应症原发性震颤麻痹及脑炎后、脑动脉硬化的震颤麻痹综合征，预防和治疗流感A型病毒。不良反应情绪幻觉、精神混乱等。长期用药可出现网状青斑伴踝部水肿，偶有尿潴留、皮疹、视力模糊等。相互作用与抗胆碱能药合用，可增强后者的不良反应。也可加重左旋多巴所致的运动障碍。用法用量口服，成人，震颤麻痹：100mg/次，2次/日，不超过200mg/日。流感A病毒感染：200mg/日，1~2次/日。儿童，1岁~9岁：每日4.4mg~8.8mg/kg，1~2次/日；9岁~12岁，100mg~200mg/日。注重事项妊娠C类。应避免驾驶、高空作业等需精神集中的活动。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com