

哌替啶 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E5_93_8C_E6_9B_BF_E5_95_B6_c22_311151.htm 药品名称哌替啶药物别名（度冷丁，唛啶，地美露，Meperidine，DOLANTIN，DEMEROL）英文名称Pethidine 类别镇痛药性状常用其盐酸盐，为白色结晶性粉末；无臭或几乎无臭。在水或乙醇中易溶，在氯仿中溶解，在乙醚中几乎不溶。制剂片剂：每片25mg；50mg。注射液：每支50mg（1ml）；100mg（2ml）。分子式成分药理及应用作用及机制与吗啡相似，亦为阿片受体激动剂。镇痛作用相当于吗啡的1/10~1/8，持续时间2~4小时。增加胆道、支气管平滑肌张力的作用较弱，能使总胆管括约肌痉挛。对呼吸有抑制作用。镇静、镇咳作用较弱。能增强巴比妥类的催眠作用。应用：各种剧痛，如创伤、烧伤、烫伤、术后疼痛等。心源性哮喘。麻醉前给药。内脏剧烈绞痛（胆绞痛、肾绞痛需与阿托品合用）。与氯丙嗪、异丙嗪等合用进行人工冬眠。用法用量1）口服1次50~100mg，1日200~400mg。极量；1次150mg，1日600mg。（2）皮下注射或肌注1次25~100mg，1日100~400mg。极量：1次150mg，1日600mg。两次用药间隔不宜少于4小时。注意事项（1）成瘾性虽比吗啡轻，但连续应用亦能成瘾。（2）副作用有头昏、头痛、出汗、口干、恶心、呕吐等。过量可致瞳孔散大、惊厥、心动过速，幻觉、血压下降、呼吸抑制、昏迷等。（3）皮下注射局部有刺激性。（4）婴幼儿慎用。1岁以内小儿一般不应静注本品或行人工冬眠。（5）不宜与异丙嗪多次合用，否则可致呼吸抑制，引起休克等不良反应。与单胺氧化酶抑制剂（MAOI）合

用可引起兴奋、高热、出汗、神志不清。(6) 其它注重事项及禁忌同吗啡。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com