

美沙酮 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E7_BE_8E_E6_B2_99_E9_85_AE_c22_311169.htm 药品名称美沙酮药物别名（美散痛，Phenadon，Amidon）英文名称Methadone 类别镇痛药性状常用其盐酸盐，为无色结晶或白色结晶性粉末；无臭。在乙醇或氯仿中易溶，在水中溶解，在乙醚中几乎不溶。制剂片剂：每片2.5mg；7.5mg；10mg。注射液：每支5mg（1ml）；7.5mg（2ml）。分子式成分药理及应用为阿片受体激动剂。镇痛效力与吗啡相等或略强，止痛效果好。t_{1/2}27.6小时，血浆蛋白结合率87.3%。适用于创伤性、癌症剧痛及外科手术后镇痛。服药后5～30分钟产生镇痛作用。用法用量（1）口服成人1日3次，每次5～10mg；儿童每日按每kg体重0.7mg计，分4～6次服。极量：1次10mg，1日20mg。（2）肌注或皮下注射 每次2.5～5mg，1日10～15mg。三角肌注射血浆峰值高，作用出现快，因此可采用三角肌注射。极量：1次10mg，1日20mg。注重事项（1）对胎儿呼吸有抑制作用，故孕妇临产前禁用。呼吸中枢功能不全者及幼儿禁用。（2）副作用有头痛、眩晕、恶心、出汗、嗜睡等，但较轻。（3）不宜作静脉注射。（4）成瘾性较小，但久用也能成瘾，应予警惕。（5）少数病例用量过大时引起失明，下肢瘫痪。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com