

丁丙诺啡 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E4_B8_81_E4_B8_99_E8_AF_BA_E5_c22_311173.htm 药品名称丁丙诺啡 英文名称Buprenorphine [] 类别镇痛药制剂注射液：每支0.15mg (1ml) ； 0.3mg (1ml) ； 0.6mg (2ml) 。 舌下含片：每片0.2mg。 分子式成分药理及应用为阿片受体部分激动剂。 镇痛作用强于哌替啶。 起效慢，持续时间长。 对呼吸有抑制作用，但临床未见严重呼吸抑制发生。 药物依赖性近似吗啡。 注射后吸收好，可通过胎盘及血脑屏障，在肝中代谢，由胆汁、粪便排泄。 主用于各种术后止痛，癌性痛、烧伤、肢体痛、心绞痛等。 作用持续时间6~8小时。 用法用量也可作戒瘾的维持治疗。 肌注或缓慢静注：每次0.15~0.3mg，舌下含服0.2~0.8mg，每隔6~8小时注1次。 注重事项常见不良反应有头晕、嗜睡、恶心、呕吐等。 颅脑损伤及呼吸抑制病人、老弱病人慎用。 本品有一定依赖性。 不良反应类似吗啡。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。 详细请访问 www.100test.com