

喷他佐辛 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022_E5_96_B7_E4_BB_96_E4_BD_90_E8_c22_311179.htm 药品名称喷他佐辛药物别名（戊唑星，镇痛新、TALWIN）英文名称Pentazocine
〔 〕类别镇痛药性状白色或类白色结晶性粉末，无臭，味苦。性稳定。不溶于水，易溶于氯仿，可溶于乙醇等。其氢溴酸盐溶于水，1%水溶液的pH为5.9。制剂片剂：每片25mg；50mg。注射液：每支15mg（1ml）；30mg（1ml）。分子式成分药理及应用为阿片受体的部分激动剂。镇痛效力较强，皮下注射30mg约相当于吗啡10mg的镇痛效应。呼吸抑制作用约为吗啡的1/2。增加剂量其镇痛和呼吸抑制作用并不成比例增加。对胃肠道平滑肌作用与吗啡相似，但对胆道括约肌作用较弱。大剂量可引起血压上升，心率加快，此作用可能与升高血浆中儿茶酚胺含量有关。口服及注射均易吸收。口服后1小时发挥作用，1次给药，作用可持续5小时以上。肌注后15分钟血浆浓度达高峰。肌注半衰期约为2小时。主要在肝脏代谢，经肾脏排泄。24小时约排出总量的60%。适用于各种慢性剧痛。用法用量静注、肌注或皮下注射，每次30mg。口服，每次25～50mg。必要时每3～4小时1次。注意事项（1）国外认为本品不易成瘾，故列为非成瘾性镇痛药，不作为麻醉药品治理。但据报道，有2例连续用药1年以上，也出现成瘾现象，因此仍应注重，切不可滥用。（2）副作用有眩晕、恶心、呕吐、出汗等。（3）大剂量可引起呼吸抑制、血压上升及心率加速。（4）对吗啡有耐受性的人，使用本药能减弱吗啡的镇痛作用，并可促使成瘾者产生戒断症状。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com