

盐酸维拉帕米 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E7_9B_90_E9_85_B8_E7_BB_B4_E6_c22_311183.htm 药品名称盐酸维拉帕米
药物别名异搏定，戊脉安、异博定 Isoptin，Calan 英文名称 Verapamilhydrochloride 类别钙拮抗药制剂片剂：40mg、80mg、120mg；缓释片剂：240mg；注射液：2ml：5mg。药理毒理本品为钙离子拮抗剂，能选择性扩张冠状动脉，增加冠脉流量；能抑制心肌兴奋性及房室传导。用于治疗阵发性室上性心动过速。药动学口服吸收完全约30min起效，维持5~8h。Tmax约30~45min，肝首过效应明显，PB90%，T1/2约3~12h，。静注后1~2min开始作用，作用持续15min。T1/2 约2~5h，长期用药或肝肾功能不全时延长。血液透析不能清除本品。适应症阵发性室上性心动过速、房性早搏、心房颤抖、心房扑动、心绞痛、高血压。不良反应与剂量有关，有眩晕、恶心、口干、腹泻、心悸等，亦可引起溢乳、心衰加重等。静注易引起低血压、心动过缓，房室传导阻滞，甚至停搏。相互作用苯巴比妥、苯妥英、磺吡酮、利福平等肝酶诱导剂可降低本品血药浓度。本品可增强地高辛、奎尼丁、哌唑嗪、茶碱、卡马西平、丙咪嗪、非去极化肌松剂、阻滞剂等的的作用，合用须减量。与丹曲林合用易致高血钾症、心脏抑制。用法用量口服，成人，40mg~80mg/次，2~3次/日，可增至240mg~480mg/日，极量480mg/日；儿童(1~5岁)，每日4mg~8mg/kg。静脉注射，5mg~10mg，15min后可重复一次，无效停用，注射时应观察心电图变化，一俟室上速消失即停止注射。静滴，5mg~10mg/h，不超过50~100mg/日。儿童(1~16岁)，每次0.1mg~0.3mg/kg，最

大5mg/次，后续最大10mg。缓释片：高血压，240mg
~ 480mg/次，1次/日。注重事项妊娠C类。孕妇、哺乳期妇女慎用。室性心律失常、心力衰竭、低血压、传导阻滞、病窦综合征、心源性休克患者禁用。洋地黄中毒时禁止用本品。本品过量可给予葡萄糖酸钙，并对症处理。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com