

布桂嗪 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E5_B8_83_E6_A1_82_E5_97_AA_c22_311186.htm 药品名称布桂嗪药物别名布新拉嗪，强痛定，丁酰肉桂哌嗪，Bucinperazine

，Butycinnamylpyrazine，Fortanodyn，AP-237）英文名称Bucinnazine 类别镇痛药性状常用其盐酸盐，为白色结晶性粉末；有异臭，味苦。在水或氯仿中易溶，在乙醇中溶解，在苯中不溶。药理及应用镇痛作用约为吗啡的1 / 3，一般注射后10分钟生效，为速效镇痛药。对皮肤、粘膜和运动器官的疼痛有明显抑制作用，对内脏器官的疼痛效果较差。临床上用于偏头痛、三叉神经痛、炎症性及外伤性疼痛、关节痛、痛经、癌症引起的疼痛等。用法用量（1）口服：成人1次60mg，1日90～180mg。小儿每次1mg / kg。疼痛剧烈时用量可酌增。（2）皮下或肌肉注射：成人1次50～100mg，1日1～2次。注重事项（1）偶有恶心或头晕、困倦等，停药后即消失。（2）连续使用本品可致耐受和成瘾，故不可滥用。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com