

螺旋霉素 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E8_9E_BA_E6_97_8B_E9_9C_89_E7_c22_311189.htm 药品名称螺旋霉素药物别名罗华密新 Rovamycin 英文名称Spiramycin 类别大环内酯类药理毒理本品为大环内酯类抗生素，抗菌谱与红霉素相似，主要对革兰阳性菌及一些革兰阴性菌、立克次体及大型病毒等有作用，如链球菌，脑膜炎球菌、百日咳杆菌、肺炎支原体、白喉杆菌、沙眼衣原体、钩端螺旋体及梭状芽胞杆菌等。对青霉素、链霉素、四环素及氯霉素耐药细菌，本品作用强。适应症各种敏感菌所致的感染，如上呼吸道感染，尿路感染、脑膜炎、乳腺炎、骨髓炎、猩红热、中耳炎、颊口部感染及鼻窦炎等。不良反应1 偶有稍微胃肠不适，如恶心、呕吐、食欲不振、便秘、腹泻。2 药物过敏罕见，一旦发现即停止用药。用法用量口服，成人6片(75万U/片)/日，分2~3次服用。儿童，每日1.5片(75万U/片)/10kg(每日0.15片/kg)，分2次服用。注重事项哺乳期产妇忌用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com