

依替卡因 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/311/2021\\_2022\\_\\_E4\\_BE\\_9D\\_E6\\_9B\\_BF\\_E5\\_8D\\_A1\\_E5\\_c22\\_311207.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E4_BE_9D_E6_9B_BF_E5_8D_A1_E5_c22_311207.htm) 药品名称依替卡因  
英文名称Etidocaine 类别局部麻醉药性状常用其盐酸盐，为白色结晶性粉末。易溶于水。其PKa为7.74。制剂注射液：每瓶300mg（30ml）。分子式成分药理及应用其局麻作用与丁比卡因相似，作用开始于2~4分钟，持续时间较了比卡因稍长。作用强度为利多卡因的4倍，毒性与利多卡因相似。对运动神经的作用强，且先于对感觉神经的作用。与肾上腺素伍用，其局部麻醉作用既可加强又可延长。主要用于硬膜外麻醉，用其1%溶液。用于神经阻滞麻醉，用其0.5%溶液。用于浸润麻醉，用其0.5%溶液。一次最大剂量300mg。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)