

癸氟奋乃静 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/311/2021\\_2022\\_\\_E7\\_99\\_B8\\_E6\\_B0\\_9F\\_E5\\_A5\\_8B\\_E4\\_c22\\_311216.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E7_99_B8_E6_B0_9F_E5_A5_8B_E4_c22_311216.htm) 药品名称癸氟奋乃静  
药物别名Prolixin Decanoate 英文名称Fluphenazine 类别长效抗精神病药  
性状淡黄色或黄棕色粘稠液体，遇光色渐变深。在甲醇、乙醇、氯仿、无水乙醚或植物油中极易溶解，在水中不溶。制剂注射液：每支25mg（1ml）分子式成分药理及应用为氟奋乃静的长效酯类化合物。药理作用同氟奋乃静，但作用较氟奋乃静长9~20倍。一般在注射后42~72小时发挥作用，48~96小时作用最明显，一次注射可在体内维持2~4周或更长。临床应用同氟奋乃静。对幻觉、妄想、木僵、淡漠、孤独和紧张性兴奋有较好疗效。对兴奋躁动和焦虑紧张也有效。对慢性精神分裂症可使淡漠和退缩减轻，改善与环境接触的反应。也可用于精神分裂症缓解期的维持治疗。贮存严密避光保存用法用量深部肌肉注射，一次25mg，2~4周1次。剂量宜从小剂量开始，以后酌情增加或减少。注重事项（1）可出现锥体外系症状。（2）既往有抽搐史或皮质下有器质性病变者、6岁以下儿童，老年患者，肝、肾功能不全患者、青光眼患者均慎用。（3）对氟奋乃静过敏者禁用。（4）严重抑郁症者忌用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)