

哌泊噻嗪棕榈酸酯 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/311/2021\\_2022\\_\\_E5\\_93\\_8C\\_E6\\_B3\\_8A\\_E5\\_99\\_BB\\_E5\\_c22\\_311221.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E5_93_8C_E6_B3_8A_E5_99_BB_E5_c22_311221.htm) 药品名称哌泊噻嗪棕榈酸酯 药物别名安棕酯，安乐嗪棕榈酸酯 英文名称Pipotiazine Palmitate 类别长效抗精神病药 性状黄色澄明油状液。制剂注射液：每支50mg（2ml）；100mg（4ml）。分子式成分药理及应用为哌泊噻嗪（Pipotiazin）的长效酯化物。肌注后缓慢从注射部位扩散并分解出哌泊噻嗪而生效，故作用维持时间长。为强效抗精神病药，并有抗组胺作用。对慢性精神病患者之退缩有显著激活作用。主要用于慢性精神分裂症。对各型精神分裂症均有一定疗效，对妄想型疗效较好。从改善症状角度来看，对消除思维障碍中的多种妄想症状及知觉障碍中的幻觉症状有明显效果。对病程较长且精神退缩的患者疗效较差。贮存避光保存。用法用量深部肌肉注射：开始剂量为50mg，1周后根据症状及反应再注射50~100mg。以后根据病情决定剂量及间隔时间，一般每3~4周1次，每次50~200mg，8~16周为1疗程。巩固期病人可酌情减少用量并适当延长注射间隔时间。注重事项（1）主要副作用为锥体外系反应，可给予苯海索等抗巴金森氏症药治疗。个别病人可出现不完全性右束支传导阻滞等心血管系统障碍。（2）偶引起严重失眠，可给予一般催眠药，禁用其他抗精神失常药。有时还可能出现焦虑、嗜睡、疲乏、无力等症状。（3）心、肝、肾等脏器有严重疾患者及年老体弱者慎用或禁用。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)