

罗红霉素 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E7_BD_97_E7_BA_A2_E9_9C_89_E7_c22_311237.htm 药品名称罗红霉素
英文名称Roxithromycin [] 类别大环内酯类制剂片剂：每片150mg。分子式成分药理及应用抗菌谱与红霉素相近，对金黄色葡萄球菌（MRSA除外）、链球菌（包括肺炎链球菌和A、B、C型链球菌，但G型和肠球菌除外）、棒状杆菌、李司忒菌、卡他摩拉菌（卡他球菌）、军团菌等高度敏感或较敏感。对口腔拟杆菌、产黑拟杆菌、消化球菌、消化链球菌、痤疮丙酸杆菌等厌氧菌以及脑炎弓形体、衣原体、梅毒螺旋体等也有较好的抗菌作用。对螺旋杆菌、淋球菌、脑膜炎球菌、百日咳杆菌等作用较弱。口服单剂量150mg，2小时血浆浓度达峰，平均 $6.6 \sim 7.0 \mu\text{g} / \text{ml}$ ，AUC为 $72.6 \sim 81 \mu\text{g} \cdot \text{h} / \text{ml}$ （口服红霉素500mg则为 $6.97 \mu\text{g} \cdot \text{h} / \text{ml}$ ）。进食后服药则吸收减少。但若与牛奶同服，因本品的脂溶性强而吸收良好，在组织和体液中分布较红霉素明显为高。在母乳中含量甚低。主要通过粪和尿排泄，以原形药物排出，也有部分脱糖代谢物。本品的半衰期为 $8.4 \sim 15.5$ 小时，远比红霉素长。老年人的药动学无明显改变。肾功能不足者， $t_{1/2}$ 延长，AUC增大，但一般不需调节剂量（因粪排泄增加）。严重酒精性肝硬化者，半衰期延长两倍，需调整给药间隔时间。应用于上述敏感菌所致的呼吸道、泌尿道、皮肤和软组织、五官科感染。用法用量成人：每次150mg，1日2次，餐前服。幼儿：每次 $2.5 \sim 5 \text{mg} / \text{kg}$ ，1日2次。老年人与肾功能一般减退者不需调整剂量。严重肝硬化者；每日150mg。注重事项（1）本品的不良反应发生率约为4.1%，常见有恶心（1.3%）、腹痛

(1.2%)、腹泻(0.8%)，较少见反应有呕吐、头痛、头晕、便秘、皮疹和瘙痒，严重反应应停药。(2)本品与红霉素间存在交叉耐药性。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com