

盐酸曲马朵 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/311/2021\\_2022\\_\\_E7\\_9B\\_90\\_E9\\_85\\_B8\\_E6\\_9B\\_B2\\_E9\\_c22\\_311239.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E7_9B_90_E9_85_B8_E6_9B_B2_E9_c22_311239.htm) 药品名称盐酸曲马朵  
药物别名曲马多、奇曼丁 英文名称Tramadol Hydrochloride  
#093. 类别镇痛药制剂注射液：1ml：50mg、2ml：100mg。胶  
囊剂：50mg。栓剂：100mg。分子式成分化学名为（±）-  
反-1-（间-甲氧苯基）-2-（二甲氨基甲基）-环己醇盐酸盐。分  
子式为：C<sub>16</sub>H<sub>25</sub>NO<sub>2</sub>HCl，分子量为299.84。药理毒理盐酸曲  
马多主要用于中枢神经系统与疼痛相关的特异受体，无致平滑肌痉挛作用。在推荐剂量下，不会产生呼吸抑制作用，对  
血液动力学亦无显著性影响。耐药性和依赖性很低。盐酸曲  
马多是胺苯环醇类人工合成弱阿片类药物，具有阿片受体激  
动和抑制中枢神经传导部位的去甲肾上腺素和5-羟色胺再摄  
取双重作用机制。药动学口服后20～30min起效，T<sub>max</sub>约2h  
，作用维持4～6h，生物T<sub>1/2</sub>为5h。口服和肌注效果相当，生  
物利用度约为64%。可透过胎盘，进入乳汁。适应症中度至  
剧烈的急性和慢性疼痛。缓解腰椎间盘突出症引起的疼痛。  
不良反应常见眩晕、恶心、呕吐、口干、倦怠、嗜睡等，静  
注过快可有颜面潮红、多汗和一过性心动过速。相互作用与  
巴比妥类并用可延长麻醉持续时间，与安定药并用可增强镇  
痛作用。用法用量肌注、口服或直肠给药，50mg-100mg/次  
，2次-3次/日，最大量400mg-600mg/日。注重事项禁用于酒精  
、安眠药、镇痛剂、镇静剂或其它中枢神经系统作用药物急  
性中毒的患者。对阿片类药物敏感者、肝肾功能不全者、心  
脏病患者及孕妇、哺乳期妇女、机械操作人员慎用。不用于  
轻度疼痛，不宜作为对阿片有依赖性的患者的代用品。本药

可能会影响病人的驾驶或机械操作的反应能力，尤其与酒同服时为甚。长期应用时不能完全排除产生依靠性的可能，疗程不应超过治疗所需。如用量超过规定剂量很多或与中枢抑制剂合用时，不能完全排除呼吸抑制的可能性。肝肾功能受损者，用药间隔应适当延长。心脏疾患酌情使用。对妊娠和哺乳的影响 怀孕、哺乳期间，应当在仔细考虑利弊使用。如在哺乳期使用，乳汁中盐酸曲马多的量为母体血液含量的0.1%。对阿片类反应强烈的患者以及惊厥患者慎用。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)