

布比卡因 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E5_B8_83_E6_AF_94_E5_8D_A1_E5_c22_311288.htm 药品名称布比卡因药物别名丁吡卡因，麻卡因 英文名称Bupivacaine 类别局部麻醉药性状常用其盐酸盐，为白色结晶性粉末；无臭、味苦。在乙醇中易溶，在水中溶解，在氯仿中微溶，在乙醇中几乎不溶。其水溶液pH为4.5～6.0。制剂注射液：每支12.5mg（5ml）；25mg（5ml）；37.5mg（5ml）。分子式成分药理及应用局麻作用强于利多卡因（约强4倍）。其0.25%～0.5%溶液引起局麻的时间一般为4～10分钟，0.75%溶液起效较之略快。用其0.5%溶液加肾上腺素作硬膜外阻滞麻醉，作用可维持5小时。由于本品在血液内浓度低，体内蓄积少，作用持续时间长，故为一比较安全的长效局麻药。用法用量浸润麻醉用0.1%～0.25%溶液；神经传导阻滞用0.5%～0.75%溶液。1次极量200mg，1日极量400mg。注重事项偶见精神兴奋、低血压等反应。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com