

丁卡因 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E4_B8_81_E5_8D_A1_E5_9B_A0_c22_311295.htm 药品名称丁卡因药物别名地卡因，潘托卡因，四卡因 英文名称Tetracaine 类别局部麻醉药性状常用其盐酸盐，为白色结晶或结晶性粉末；无臭，味微苦，有麻舌感。在水中易溶，在乙醇中溶解，在乙醚或苯中不溶。制剂注射液：50mg（5ml）。分子式成分药理及应用局麻作用比普鲁卡因强，毒性亦较大，能透过粘膜，主要用于粘膜麻醉。作用迅速，1～3分钟即生效。维持20～40分钟。眼科用0.5%～1%溶液，鼻咽喉科用1%～2%溶液，总量不得超过20ml。应用时应于每3ml中加入0.1%盐酸肾上腺素溶液1滴。浸润麻醉用0.025%～0.03%溶液，神经传导阻滞用0.1%～0.3%溶液。腰麻时用10～15mg与脑脊液混合后注入。硬膜外麻醉用0.15%～0.3%溶液，与利多卡因合用时最高浓度为0.3%。极量：浸润麻醉、神经传导阻滞，1次0.1g。注重事项大剂量可致心脏传导系统和中枢神经系统抑制。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com