

盐酸拉贝洛尔 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E7_9B_90_E9_85_B8_E6_8B_89_E8_c22_311298.htm 药品名称盐酸拉贝洛尔
药物别名柳胺苄心安 Trandate，Normodyne 英文名称Labetalol
Hydrochloride 类别降血压药制剂片剂：50mg、100mg、200mg
；注射液：5ml：25mg、5ml：50mg。药动学口服首过效应
明显，生物利用度约25%~40%，T_{max}约1~2h，约0.4~2h起
效，1~4h达高峰，持续约8h。静脉注射2~5min起效，5
~15min达高峰，持续2~4h。主要在肝脏代谢，原药与代谢
物经肾脏和粪便排出，T_{1/2}为4~8h。适应症中至重度高血压
。注射用于高血压危象，嗜铬细胞瘤手术时控制血压。不良
反应胃肠道反应、直立低血压、心悸、眩晕、乏力、嗜睡、
鼻塞、幻觉、性功能障碍等。亦有皮疹、注射部位疼痛。长
期应用可引起类风湿性关节炎和红斑狼疮综合征。相互作用
西咪替丁、利尿药、其它降压药可增强本品作用用法用量剂
量宜个体化。口服，成人，100mg/次，2次/日，根据疗效隔
日调整，维持量200mg~400mg/次，2~3次/日，不宜超
过2.4g/日。儿童，每日3mg~4mg/kg，2次/日；根据疗效隔日
调整，可达每日20mg/kg。静脉注射，成人，20mg或1mg
~2mg/kg缓慢注射，必要时15min后重复。静脉滴注
，2mg/min，根据反应调整剂量，总量可达300mg。注重事项
妊娠C类。妊娠、哺乳期妇女慎用。心源性休克、充血性心
力衰竭、传导阻滞、脑溢血及支气管哮喘患者禁用。肝功能
不全慎用。本品宜餐后服用。老年患者、合用利尿药时须适
当减量。嗜铬细胞瘤偶可引起异常高血压。100Test 下载频道
开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com