

己氨胆碱 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/311/2021\\_2022\\_\\_E5\\_B7\\_B1\\_E6\\_B0\\_A8\\_E8\\_83\\_86\\_E7\\_c22\\_311301.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E5_B7_B1_E6_B0_A8_E8_83_86_E7_c22_311301.htm) 药品名称己氨胆碱 英文名称Hexcarbacholine [ ]

类别骨骼肌松弛药制剂注射液

：每支4mg（2ml）；8mg（2ml）。分子式成分药理及应用常用

其溴化物，属双相型肌松剂，首先是引起去极化，持续几

分钟，接着产生非去极化的筒箭毒碱样的持久性麻痹。作用

开始比琥珀胆碱缓慢，但较持久，可维持40～60分钟。适用于

长时间手术。用法用量静注：1次量2～4mg（极量：8mg）

。重复应用时，一般每kg体重不宜超过40μg。注重事项（1）

肾功能不全者及孕妇分娩前禁用。（2）能使眼压暂时性

增高，不宜用于眼内手术，青光眼病人慎用。（3）与氯丙

嗪类或六甲溴铵等合用时要减量。（4）麻醉结束后，常发

生通气不足，故手术结束前1小时不宜再用。（5）中毒时，

先用阿托品（静注0.5～1mg），再给新斯的明（静注1

～2.5mg）。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载

。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)