

粘菌素 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E7_B2_98_E8_8F_8C_E7_B4_A0_c22_311320.htm 药品名称粘菌素药物别名

Colistin 英文名称多粘菌素E，类别其他抗菌抗生素性状常用其硫酸盐，为白色或微黄色粉末；无臭或几乎无臭。有引湿性。在水中易溶，在乙醇中微溶，在两酮、氯仿或乙醚中几乎不溶。制剂片剂：每片50万单位；100万单位；300万单位。灭菌粉剂：每瓶100万单位，供制备溶液用

（1mg=.6500单位）。药理及应用抗菌谱和体内过程与多粘菌素B相同。口服不吸收，用于治疗大肠杆菌性肠炎和对其他药物耐药的菌痢。外用于烧伤和外伤引起的绿脓杆菌局部感染和耳、眼等部位敏感菌感染。注射已少用。用法用量（1）口服：成人1日150万～300万单位分3次服。儿童1次量25万～50万单位，1日3～4次。重症时上述剂量可加倍。（2）外用：溶液剂1万～5万单位/ml，氯化钠注射液溶解。注意事项（1）可发生皮疹、瘙痒等过敏症状。胃肠道副作用有恶心、呕吐、食欲不振、腹泻等反应。（2）孕妇、肾功能不全患者慎用。（3）口服宜空腹给药。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com