

依替唑仑 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E4_BE_9D_E6_9B_BF_E5_94_91_E4_c22_311334.htm 药品名称依替唑仑 药物别名乙噻二氮，乙替唑仑DEPAS 英文名称Etizolam 类别抗焦虑药 性状本品为白色或微黄白色结晶性粉末，无臭、无味。可溶于甲醇、氯仿、0.1mol/L盐酸试溶液，易溶于乙醇，略溶于醋酸乙酯、乙醚，几乎不溶于水。熔点146~149℃。制剂片剂：每片0.5mg；1mg。颗粒剂：10mg。分子式成分药理及应用属苯二氮类抗焦虑药，其抗焦虑作用比地西洋强3~5倍，但其作用又与地西洋不完全相同。本品可抑制脑内去甲肾上腺素的周转率和肌挛缩（ α_2 型），其作用机制主要是通过通过对大脑边缘系统尤其是扁桃核，抑制网状结构激活系统而产生镇静和催眠作用。常用的苯二氮类药物抗肌挛缩而致的惊厥，对 α_1 型肌挛缩强而对 α_2 型肌挛缩弱，本品则对 α_1 型和 α_2 型肌挛缩均有较强的抑制作用，因而具有很强的中枢性肌松作用。口服可迅速自胃肠道吸收，最后自粪便及尿排出体外。经肝脏代谢，原形药的血浆 $t_{1/2}$ 约为3小时，代谢物的 $t_{1/2}$ 为8~16小时。长期服用无蓄积作用。急性毒性较小。药物依赖性几乎与现有的苯二氮类相同。本品适用于治疗各种原因引起的焦虑、紧张、抑郁、失眠等疾病。用法用量口服：对神经疾患、抑郁症患者的焦虑、紧张、抑郁，1次1mg，每日3次。对身心疾患、颈椎病、腰痛症、肌收缩性头痛所致的症状，0.5mg，每日3次。对睡眠障碍者，睡前1次服用1~3mg。老年人每日最大剂量1.5mg。注重事项（1）本品副作用发生率较低，长期大量应用可出现依赖性。偶见谵妄、震颤、失眠、不安、兴奋、头昏、妄想、焦躁、视力模糊、ALT及AST

升高、呼吸困难、心悸、竖立时眩晕、恶心、呕吐、便秘、乏力、出汗、排尿困难等。罕见过敏反应。（2）停药时应逐渐减量。（3）其它注重事项参见本节苯二氮类药物项下。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com