

阿普唑仑 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E9_98_BF_E6_99_AE_E5_94_91_E4_c22_311343.htm 药品名称阿普唑仑
药物别名甲基三唑安定、佳静安定，Xanax 英文名称Alprazolam
类别抗焦虑药制剂片剂：每片0.25mg；0.4mg，0.5mg；1mg。
分子式成分药理及应用本品为新的苯二氮类药物，具有同地西洋相似的药理作用，有抗焦虑、抗惊厥、抗抑郁、镇静、催眠及肌肉松弛等作用，其抗焦虑作用比地西洋强10倍，其作用机制可能与脑内 γ -肾上腺素受体有关。本品口服吸收迅速而完全，1~2小时即可达血药峰浓度，老年妇女比青年人吸收快。吸收后分布于全身，并可透过胎盘屏障，乳汁中亦有药物。经肝脏代谢为活性物质 γ -羟三唑安定，但浓度太低无临床意义。最后自肾脏排出体外，血浆 $t_{1/2}$ ，青年人平均为10~12小时，老年人平均为19小时。本品适用于治疗焦虑症、抑郁症、失眠。用法用量口服：抗焦虑1次0.4~0.8mg，1日0.8~1.6mg。开始每次0.25~0.5mg，每日3次，以后酌情增减，最大剂量每日4mg。老年人开始0.25mg，每日2次。抗抑郁：开始从小剂量用起，一般为每日2~4mg，分次服，个别病人可增至每日10mg。用至大剂量无效时，不宜再用本品。镇静、催眠：0.4~0.8mg，睡前顿服。镇静：每次0.25mg，每日3次，必要时可酌增用量。注重事项（1）不良反应与地西洋相似，但较稍微。少数患者有倦乏、头晕、口干、恶心、便秘、视力模糊、精神不集中等。近期报道，久用后停药有戒断症状，应避免长期使用。（2）禁用于对苯二氮类药物过敏者、青光眼病人、孕妇及哺乳期妇女。（3）应逐渐停药，不可突停或减量过快，以免造成疾病反跳或出现戒断症

状。（4）服用本品者不宜驾驶车辆或操作机器。（5）本品与中枢抑制药、酒、含酒精饮料合用时，可增强中枢抑制作用，合用时应注重调整剂量。H₂受体阻断剂西咪替丁可延长本品的t_{1/2}时间。（6）18岁以下儿童应慎用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com