

新斯的明 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/311/2021\\_2022\\_\\_E6\\_96\\_B0\\_E6\\_96\\_AF\\_E7\\_9A\\_84\\_E6\\_c22\\_311411.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E6_96_B0_E6_96_AF_E7_9A_84_E6_c22_311411.htm)

药品名称新斯的明 英文名称Neostigmine 类别拟胆碱药性状两种盐都是白色结晶性粉末，无臭，苦味。在水中极易溶解，在乙醇中易溶。制剂片剂：每片15mg。注射液：每支0.5mg（1ml）；1mg（2ml）。分子式成分药理及应用具有抗胆碱酯酶作用，但对中枢神经系统的毒性较毒扁豆碱弱；因尚能直接作用于骨骼肌细胞的胆碱能受体，故对骨骼肌作用较强；缩瞳作用较弱。多用于重症肌无力及腹部手术后的肠麻痹。口服其溴化物，1次15mg，1日45mg；极量：1次30mg，1日100mg。皮下注射、肌注其甲硫酸盐，每日1~3次，每次0.25~1.0mg；极量：1次1mg，1日5mg。由于口服后在肠内有一部分被破坏，故口服剂量远较注射剂量为大。以0.05%眼药水用于青少年假性近视眼，1日2次，每次1~2滴，3个月为1疗程。注重事项（1）大剂量时可引起恶心、呕吐、腹泻、流泪、流涎等，可用阿托品对抗。（2）癫痫、心绞痛、室性心动过速、机械性肠梗阻、尿路梗塞及支气管哮喘病人禁用 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)