

氯氮+桌 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/311/2021\\_2022\\_\\_E6\\_B0\\_AF\\_E6\\_B0\\_AE\\_E8\\_89\\_B9\\_E6\\_c22\\_311428.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E6_B0_AF_E6_B0_AE_E8_89_B9_E6_c22_311428.htm) 药品名称氯氮+桌药物别名利眠宁，甲氨二氮，LIBRIUM 英文名

称Chlordiazepoxide 类别抗焦虑药性状为淡黄色结晶性粉末；无臭，味苦。在乙醚、氯仿或二氯甲烷中溶解，在水中微溶。制剂片剂：每片5mg；10mg。注射用氯氮：每支50mg；100mg。分子式成分药理及应用具有镇静、抗焦虑、肌肉松弛、抗惊厥作用。常用于治疗焦虑性和强迫性神经官能症、癔病、神经衰弱患者的失眠及情绪烦躁、高血压头痛等。还可用于酒精中毒及痉挛（如破伤风和各种脑膜炎所致的抽搐发作）。与抗癫痫药合用，可抑制癫痫大发作，对小发作也有效。口服吸收较慢但完全，4小时达高峰血浓度。肌注比口服吸收慢。经肝脏先后转化为具有相似药理活性的去甲氯氮和去甲氧安定。自肾排泄缓慢，半衰期为20~24小时。用法用量口服：镇静，成人，1次5~10mg，1日15~40mg。严重病例可1次20mg，每日3次。如症状改善，应立即减为1次5~10mg。年老体衰者应减量。儿童镇静用，5岁以上每次5mg，每日1~3次。催眠，10~20mg，睡前服。严重者可同时服用小剂量其他催眠药。抗癫痫，1次10~20mg，1日30~60mg。神志昏迷的抽搐患者，肌注或静注：成人每次25~50mg，必要时2小时再重复1次，儿童抗惊厥每日3~5mg/kg，分4次给予。注重事项（1）本品有嗜睡、便秘等副作用，大剂量时可发生共济失调（走路不稳）、皮疹、乏力、头痛、粒细胞减少及尿闭等症状，偶见中毒性肝炎及粒细胞减少症，肾、肝功能减退者宜慎用。（2）本品以小剂量多次服用为佳，

长期大量服用可产生耐受性并成瘾，男性患者可导致阳痿。久服骤停可引起惊厥。（3）本品能加强吩噻嗪类安定剂（如氯丙嗪）和单胺氧化酶抑制剂（如优降宁）的作用，与吩噻嗪类、巴比妥类、酒精等合用时有加强中枢抑制的危险。（4）老年人用药后易引起精神失常甚至昏厥，故应慎用。（5）哺乳期妇女及孕妇应忌用，尤其是妊娠开始3个月及分娩前3个月。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)