

盐酸曲唑酮 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E7_9B_90_E9_85_B8_E6_9B_B2_E5_c22_311458.htm 药品名称盐酸曲唑酮

药物别名美抒玉、美舒郁 Mesyrel 英文名称Trazodone

HydroChloride 类别抗抑郁症药制剂片剂：50毫克/片。避免高温保存。分子式成分三唑吡啶类衍生物，其结构

为2-[3-[4-(3-氯苯基)-1-哌嗪基]丙基]-1,2,4-三唑[4,3-a]吡啶-3(2H)-盐酸，为一种白色无味品状体粉末，易溶于水。药理毒理盐酸曲唑酮为特异性5-经色胺的再摄取抑制剂。由于

具有 1肾上腺素能拮抗作用与抗组织胺作用，可诱发体位低血压。该药不是一种单胺氧化酶抑制剂，而且与苯丙胺类药物不同，对中枢神经系统没有兴奋作用。药动学在人体内，口服能很好地吸收，峰值血浆水平发生在空腹服用后大约一

小时，与食物同服后两小时。消除呈两相，包括个初始相(半衰期3~6小时)和随后的缓慢相(半衰期59小时)，由于的体内清除率变化很大，有些患者服用后可能在血浆内蓄积。适应症治疗抑郁症和伴随抑郁症状的焦虑症以及药物依靠者戒断

后的情绪障碍。不良反应常见不良反应为嗜睡、疲乏、头晕、头疼、失眠、紧张和震颤等；以及视物模糊、口干、便秘。少见体位性低血压和心动过速、恶心、呕吐和腹部不适。

极少数病人出现肌肉骨骼疼痛和多梦。临床研究中曾报道一些不良反应可能和盐酸曲唑酮)的使用有关；静坐不能、过敏反应、贫血、胃胀气、排尿异常、性功能障碍和月经异常等，但见之于为数其少的患者。实验室检查 服药的病人偶然可出现白细胞总数和中性粒细胞计数减低，若白细胞计数或中性粒细胞数低于正常范围，则应该停药观察。对于在治疗期

间出现发热或咽喉疼痛(或其他感染症状)的病人，建议检查白细胞及分类计数。相互作用假如同时合用地高辛或苯妥因，可使地高辛或苯妥因的血浆水平升高。可能会加强对酒精、巴比妥类和其他中枢神经系统抑制剂的作用。目前尚缺乏该药和单胺氧化酶(MAO)抑制剂之间是否会发生药物相互作用的临床经验，故两种药物互换使用时，一般应间隔两周。用法用量剂量和用法 剂量应该从低剂量开始，逐渐增加剂量并观察治疗反。有昏睡出现时，须将每日剂量的大部分分配至睡前服用或减量。服药第一周内症状即有所缓解，两周内出现较佳抗抑郁效果。通常需要服药两周至四面才出现最佳疗效。成人常用剂量 建议初始剂量为50-100mg/日(分次服用)，然后每三至四天剂量可增加50mg/日。门诊病人一般以200mg/日(分次服用)为宜，住院病人较严重者剂量可较大。最高用量不超过400mg/日(分次服用)。维持治疗 长期维持的计量应保持在最低有效量。一旦有足够的疗效，可逐渐减量。一般建议治疗的疗程应该持续数月。注重事项对盐酸曲唑酮过敏者不可服用，如严重的心脏病或心律不齐者禁用，意识障碍者禁用。有些病人服用该药是可能会出现低血压、包括体位性低血压和晕厥。假如与降压药合用，需要减少降压药的剂量。和全麻药的相互作用了解甚少，因而在择期手术前，应在临床许可的情况下尽早停用。执行有潜在危险任务(如开车或开机器)者，用药期间须加小心。应在餐后服用，禁食条件空腹服药，头晕或头昏有可能会增加。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com