

维拉帕米 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022_E7_BB_B4_E6_8B_89_E5_B8_95_E7_c22_311462.htm 药品名称维拉帕米药物别名异搏定，戊脉安，凡拉帕米，异搏停，Iproveratril，ISOPTIN 英文名称Verapamil 类别钙拮抗药性状常用其盐酸盐，为白色粉末；无臭。在甲醇、乙醇或氯仿中易溶，在水中溶解。熔点140～145℃。制剂片剂：每片40mg。注射液：每支5mg(2ml)。分子式成分药理及应用为钙通道阻滞剂（钙拮抗剂）。由于抑制钙内流可降低心脏舒张期自动去极化速率，而使窦房结的发放冲动减慢，也可减慢传导。可减慢前向传导，因而可以消除房室结折返。对外周血管有扩张作用，使血压下降，但较弱，一般可引起心率减慢，但也可因血压下降而反射性心率加快。对冠状动脉有舒张作用，可增加冠脉流量，改善心肌供氧，此外，它尚有抑制血小板聚集作用。口服吸收完全，30～45分钟血药浓度达峰值，30分钟起效，维持5～6小时。口服的85%经肝灭活，故口服剂量较静注者大10倍。在血浆中90%与血浆蛋白结合。静注后1～2分钟开始作用，10分钟达最大效应，作用持续15分钟。可用于抗心律失常及抗心绞痛。对于阵发性室上性心动过速最有效；对房室交界区心动过速疗效也很好；也可用于心房颤动、心房扑动、房性早搏。贮存遮光，密闭保存。用法用量口服：1次40～120mg，1日3～4次，维持剂量为1次40mg，1日3次，稀释后缓慢静注或静滴，0.075～0.15mg/kg，症状控制后改用片剂口服维持。注意事项（1）可有眩晕、恶心、呕吐、便秘、心悸等不良反应。（2）若与 阻滞剂合用，易引起低血压、心动过缓、传导阻滞，甚至停搏。（3）支气管哮喘

患者慎用。心力衰竭者慎用或禁用。低血压、传导阻滞及心源性休克患者禁用。（4）与地高辛合用可使后者的血药浓度升高，如需合用时应调整地高辛剂量。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com