

八厘麻毒素 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E5_85_AB_E5_8E_98_E9_BA_BB_E6_c22_311495.htm 药品名称八厘麻毒素
英文名称Rhomotoxine 类别降血压药制剂注射液：每支1mg
(1ml)。片剂：每片0.25mg分子式成分由八厘麻(即闹羊花的果实)中提取而得。药理及应用有较强的降压作用和减慢心率作用。临床试用表明，静注本品后多数病人在10分钟以内即开始降压平均为9.3 / 4.9kPa，持续1.5~2小时以上。由于降压幅度大、速度快、持续时间长(与硝普钠相比，本品的降压生效时间略较慢，强度相似，且维持降压时间较长)，故适用于重症高血压病人的快速降压。其药理作用与副交感功能有关。用法用量(1)静滴：1次量1.5~2.5mg，加入5%~10%葡萄糖液200~500ml，以30~40 μg / 分的速度滴入。当血压达下降水平或出现明显不良时立即停药。于半小时至3小时滴完。(2)静注：0.75~1.5mg(一般为1mg)加入50%葡萄糖液40ml中，于5~8分钟内均匀注入。如血压下降或出现明显副作用。立即停止静注。(3)口服：1次0.5~0.75mg，1日3次，宜空腹服用。1次极量：1mg注重事项(1)副作用以烧灼感、麻木感为多见，其次为头晕、口干、恶心、呕吐、眼花、胸闷、心跳缓慢、血压过低、重度烧灼麻木感等。血压过低时可用麻黄碱，心率过缓时可用阿托品对抗之。加服氢氧化铝，可减轻胃部不适。(2)本品降压作用在停药后0.5~1小时仍继续加深，故绝不可因已用完一定剂量药物血压尚未满足下降而再加量，以免血压过度下降而导致休克。(3)普鲁卡因可减弱本品的降压作用，故不宜合用。(4)继发性高血压及恶性高血压病人慎用，危重及垂危病人(包

括严重心力衰竭、心肌病变，房室传导阻滞和严重的室性心律失常等)禁用。(5)肌注易引起局部疼痛。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com