

东莨菪碱 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E4_B8_9C_E8_8E_A8_E8_8F_AA_E7_c22_311507.htm

药品名称东莨菪碱
英文名称Scopolamine 类别抗胆碱药性状常用其氢溴酸盐，为无色结晶或白色结晶性粉末；无臭；微有风化性。在水中易溶，在乙醇中略溶。制剂片剂：每片0.2mg。注射液：每支0.3mg（1ml）；0.5mg（1ml）。晕动片：每片含本品0.2mg、苯巴比妥钠30mg、阿托品0.15mg，对因颠簸引起的晕车有效，每次服1~2片，半小时后见效。使保定（SCOPODERM TTs）每贴含1.5mg分子式成分药理及应用作用与阿托品相似，其散瞳及抑制腺体分泌作用比阿托品强，对呼吸中枢具兴奋作用，但对大脑皮质有明显的抑制作用，此外还有扩张毛细血管、改善微循环以及抗晕船晕车等作用。临床用为镇静药，用于全身麻醉前给药、晕动病、震颤麻痹、狂躁性精神病、有机磷农药中毒等。由于本品既兴奋呼吸又对大脑皮质呈镇静作用，故用于抢救极重型流行性乙型脑炎呼吸衰竭（常伴有剧烈频繁的抽搐）亦有效。用法用量口服：1次0.2~0.6mg，1日0.6~1mg，极量；1次0.6mg，1日2mg。皮下注射：1次0.2~0.5mg，极量；1次0.5mg，1日1.5mg。抢救乙型脑炎呼吸衰竭：以1ml含药0.3mg的注射剂直接静注或稀释于10%葡萄糖溶液30ml内作静滴，常用量为0.02~0.04mg/kg，用药间歇时间一般为20~30分钟，用药总量最高达6.3mg。注重事项参见阿托品（青光眼病人亦忌用）。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com