

盐酸地尔硫卓注射剂 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E7_9B_90_E9_85_B8_E5_9C_B0_E5_c22_311525.htm

药品名称盐酸地尔硫卓注射剂
药物别名恬尔心，硫氮卓酮、合心爽、蒂尔丁
Diltiazem，Cardizem，Herbesser 英文名

称DiltiazemHydrochloride#093. 类别钙拮抗药制剂粉针剂

：10mg、50mg。分子式成分化学名：顺-(-)-5- [(2-二甲氨基)乙基] -2-(4-甲氧基苯基)-3-乙酰氧基-2,3-二氢-1,5-苯丙硫氮杂卓-4(5H)-酮盐酸盐。分子式：C₂₂H₂₆N₂O₄SHCL。分子量：450.99。

药理毒理本品为钙离子拮抗剂，是一种强效冠脉扩张剂，扩张四周血管，改变全身血流分布，增加冠脉血流量，降低冠状静脉氧差，并有降低心率和血压作用。药动学口服吸收较完全，T_{max}约2~3h。肝脏首过效应明显，生物利用度为40%，PB约80%。口服单次或多次给药血浆T_{1/2}为3.5h，缓释片T_{1/2}为5~7h，静脉注射T_{1/2}为1.9h。适应症各型心绞痛和高血压，也用于室上性快速心律失常。不良反应常见有浮肿、头痛、眩晕、恶心、皮疹等；少见有心绞痛加重、房室传导阻滞、低血压、震颤、嗜睡、多梦、幻觉、弱视、耳鸣、夜尿、厌食、转氨酶升高、高尿酸血症等。

相互作用西咪替丁等抑制P-450细胞色素酶系活性的药物可升高本品浓度；硝苯地平、胺碘酮等亦可增强本品作用。洋地黄毒甙（地高辛等）、受体阻滞剂（普萘洛尔、阿替洛尔、美托洛尔等）、芬太尼等麻醉药、卡马西平、锂制剂、茶碱、环孢素等与本品合用，两者作用均增强，应减低剂量，必要时监测药物浓度。用法用量口服：成人，开始30mg，2

~ 4次/日，餐前或临睡前服，剂量每1~2日逐渐增加，至获得理想疗效，平均剂量范围为90mg~360mg/日。缓释片：30mg~120mg/次，2次/日。静脉注射：成人，初次为10mg或0.15mg~0.25mg/kg，临用前用氯化钠注射液或葡萄糖注射液稀释成1%浓度，在3min内缓慢注射，15min后可重复；也可每分钟5g~15g/kg静脉滴注。缓释片：一般用量，天天一粒。药物可以在一天的任何时间服用，但必须在天天的同一时间服用。缓释胶囊应整颗吞下，不要打开，也不要咀嚼。注重事项妊娠C类。孕妇、哺乳期妇女、小儿慎用。严重低血压、和度房室传导阻滞、病窦综合征以及对本品过敏者禁用，肝肾功能受损者慎用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com