

盐酸米安色林 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/311/2021\\_2022\\_\\_E7\\_9B\\_90\\_E9\\_85\\_B8\\_E7\\_B1\\_B3\\_E5\\_c22\\_311540.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E7_9B_90_E9_85_B8_E7_B1_B3_E5_c22_311540.htm) 药品名称盐酸米安色林  
药物别名米塞林，脱尔烦 Tolvon，Bolvidon 英文名  
称MianserinHydrochloride 类别抗抑郁症药制剂片剂：10mg、20mg、30mg。药动学口服易吸收，生物利用度约70%，Tmax 为3h。大部分以代谢产物经肾脏排泄。T1/2 为32h。适应症抑郁症不良反应常见嗜睡，骨髓抑制，表现为白细胞减少、粒细胞减少或缺乏，偶见再生障碍性贫血、肝功能障碍、乳腺异常等。相互作用不宜与单胺氧化酶抑制剂同时应用。与抗高血压药物如胍乙啶、苄二甲胍、胍苯哒嗪、甲基多巴、普萘洛尔、可乐定等合用时宜监测血压；合用苯妥英时应监测苯妥英的血浆浓度；合用乙醇会增剧其中枢抑制效应。用法用量口服，20mg~30mg/日，渐增至90mg/日。分次服或睡前顿服。注重事项孕妇、哺乳期妇女禁用。严重肝病伴躁狂症者禁用。糖尿病、癫痫、肝肾功能不全者慎用；用药期间不宜驾车或操作机器。定期作全血细胞计数；当病人出现感染体征时应立即停药。对伴有心血管障碍、青光眼或前列腺肥大者应小心监护；本品不宜治疗双相(抑郁躁狂症)病人，有可能将抑郁相转变为躁狂相。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)