

氨磺洛尔 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/311/2021\\_2022\\_\\_E6\\_B0\\_A8\\_E7\\_A3\\_BA\\_E6\\_B4\\_9B\\_E5\\_c22\\_311550.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E6_B0_A8_E7_A3_BA_E6_B4_9B_E5_c22_311550.htm) 药品名称氨磺洛尔  
英文名称Amosulalol〔 〕 类别中药药理及应用本品能阻断  
及 受体，可降低血压，其降压效价强度为普萘洛尔的1  
/ 16 ~ 1 / 12。口服后血药浓度达峰时间为2 ~ 4小时。在体内  
被肝代谢，约有25%以原形由尿排出。t<sub>1/2</sub>约5小时，可用于  
原发性高血压及嗜铬细胞瘤性高血压，用药后血压下降迅速  
、持久。不良反应不良反应发生率约14%。主要有体位性头  
晕、头痛及胃肠道症状。开始应用过量易发生低血压及心动  
过缓。其禁忌证同阿罗洛尔。不良反应发生率约14%。主要  
有体位性头晕、头痛及胃肠道症状。开始应用过量易发生低  
血压及心动过缓。其禁忌证同阿罗洛尔。用法用量口服，自  
小剂量开始，渐增至20 ~ 60mg / 日，分2次服。常用其片剂，  
每片10mg。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。  
详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)