

卡维地洛 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E5_8D_A1_E7_BB_B4_E5_9C_B0_E6_c22_311556.htm

药品名称卡维地洛
英文名称Carvedilol〔 〕类别 受体阻断药分子式成分 药

理及应用本品可阻断 及 受体，无内在活性。在高浓度时尚具钙拮抗作用。其阻断 受体的作用较强，为拉贝洛尔的33倍，为普萘洛尔的3倍。可扩张血管、减少外周阻力和降低血压，对输出量及心率影响不大。药动学口服后吸收迅速，约2小时达血药浓度峰值。生物利用度约30%。在血浆中与血浆蛋白结合率为95%。具有较大程度的首过效应。t_{1/2}

约2小时；t_{1/2} 约14小时。不良反应常见的不良反应有头晕、头痛、乏力。可发生心动过缓。慢性梗阻性肺疾患、糖尿病患者、肝功能低下者、孕妇及授乳妇禁用。用法用量可用于原发性高血压及心绞痛。初次剂量为25mg / 日，1次服下；可根据需要渐增剂量至50mg / 日，分1~2次服下；最大日剂量不超过100mg。常用其片剂，每片25mg。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com