

柳胺苄心定 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/311/2021\\_2022\\_\\_E6\\_9F\\_B3\\_E8\\_83\\_BA\\_E8\\_8B\\_84\\_E5\\_c22\\_311560.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E6_9F_B3_E8_83_BA_E8_8B_84_E5_c22_311560.htm) 药品名称柳胺苄心定  
药物别名拉贝洛尔 英文名称Benzaminosalicylamidi

Hydrochloridum 类别 受体阻断药制剂10ml：50mg / 支。  
药理毒理柳胺苄心定为、 肾上腺素受体阻滞药。其选择性阻断 受体，同时又对 受体阻断， 与 受体阻滞作用之比，静注时为1：6.9，对 受体的作用为较强，临床使用观察表明对各类高血压有显著的降压效应，其动脉血压平均下降约20%；运动时降压尤为明显。本品可减慢A - V传导，在降压的同时可使心率减慢，心输出量有所降低，冠脉流量增加。四周血管阻力持续降低，血流动力学呈良性变化，对血清中脂质、脂蛋白及尿酸浓度无明显影响。药动学静脉给药，1分钟内出现药理作用，10分钟达最大值。本品药代动力学显示个体差异显著，静注给药半衰期为3.4 - 4.5小时。本品主要在肝脏代谢，其代谢物无生理活性且由尿排出，还有相当部分可能由肠壁清除，其清除率随年龄的增加而降低。适应症各种程度的高血压，包括对其它药物有耐受性的原发性高血压、继发性高血压。妊娠高血压。各种外科手术前的预备、手术中控制性降压。高血压危象，是各类高血压紧急降压的理想药物。伴有心绞痛或有心衰史的高血压患者。不良反应本品耐受性良好，偶有患者分别会有疲乏、嗜睡、头痛、头晕、胃肠不适等，但这些反应较轻，是暂时性的，于继续用药数周后可自行消失。当使用本品每日剂量在1g以下时，体位性低血压这一与剂量相关的不良反应较罕见。用法用量本品可用静脉推注或静脉滴注方式给予患者，用药时需取卧

位。静脉推注：每次25 - 50mg，加10%葡萄糖注射液20ml，于5 - 10分钟内缓慢推注，如降压效果不理想可于15分钟后重复一次，直至产生理想的降压效果。总剂量不应超过200mg，一般推注后5分钟内出现最大作用，约维持6小时。静脉滴注：本品100mg加5%葡萄糖注射液或氯化钠注射液（0.9%）稀释至250ml，静脉滴注速度为1 ~ 4mg / 分，直至取得较好的效果，然后停止滴注，有效剂量为50 - 200mg，但对嗜铬细胞瘤患者可能需300mg或以上，滴注过程中应监视血压和脉率变化。

注重事项1．少数患者出现体位性低血压，但可自愈，个别患者血压下降过低，可用新福林，或阿托品予以拮抗。2．应于卧位注药，注射毕静卧10 - 30分钟，以防体位性低血压的发生。3．降压效果与用药量有关，用时注重剂量，并监测血压。4、滴注时切勿过速，以防降压过快。5．脑溢血，心动过缓及传导阻滞等患者不宜使用。支气管哮喘，肝病者慎用。若单用本品疗效不理想或剂量较大出现不良反应者，可并用利尿剂或可乐定，以增强降压效果，并遵医嘱。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)