

盐酸阿米替林 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/311/2021\\_2022\\_\\_E7\\_9B\\_90\\_E9\\_85\\_B8\\_E9\\_98\\_BF\\_E7\\_c22\\_311564.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E7_9B_90_E9_85_B8_E9_98_BF_E7_c22_311564.htm) 药品名称盐酸阿米替林  
药物别名阿密替林 Amitid，Amitril 英文名称Amitriptyline  
Hydrochloride 类别抗抑郁症药制剂片剂：10mg、25mg、50mg  
；缓释片：50mg；注射液：10mg。药理毒理抗抑郁，可使  
各类抑郁症患者情绪提高，对其思考缓慢，行为迟缓及食欲  
不振有所改善，有较强的镇静催眠作用药动学口服易吸收  
，T<sub>max</sub>约2.2~4.7h，首过效应明显，生物利用度仅31%~61%  
。PB为82%~96%；在肝内代谢为活性产物去甲替林。经肾脏  
排泄，T<sub>1/2</sub>为9~36h。适应症抑郁症，非凡是内源性抑郁症  
。也用于遗尿症、惧怕症、强迫症等。不良反应口腔异味、  
口干、便秘、排尿困难、视力模糊和眼内压增高等，还有精  
神混乱、竖立性低血压、心律失常、胃炎、荨麻疹、血糖浓  
度改变等；偶见锥体外系症状、血液系统障碍、性欲改变等  
。相互作用三环类抗抑郁药与单胺氧化酶抑制剂(MAOI)合用  
，不良反应可互相增强，并可出现高血压、高热危象和惊厥  
等症状。中枢抑制药会增强三环抗抑郁药的镇静作用。麻醉  
药还会增加三环类药物引起低血压或心律失常的危险。三环  
类抗抑郁药可对抗胍乙啶和其它降压药如甲基多巴和氯压定  
的降压作用，而增强拟交感药非凡是直接作用的拟交感药如  
肾上腺素和去甲肾上腺素的升压作用。会增强抗胆碱药的作  
用。西咪替丁、哌甲酯、吩噻嗪类等可减慢三环类的代谢而  
提高其血药浓度。用法用量抑郁症：口服50mg~100mg/日，1  
~2次/日，每1~2日增加25~50mg至150mg/日；维持量50mg  
~100mg/日，一个疗程约3个月，逐渐减量停药。青少年或老

年人，10mg～50mg/日，维持量减半。肌肉注射或静脉注射，10mg～30mg，4次/日，尽可能换口服。遗尿症：口服，6～10岁，10mg～20mg；11岁以上，25mg～50mg；睡前服，疗程不超过3个月。注重事项妊娠D类。孕妇、哺乳妇女、幼儿禁用。不适用于治疗双相(躁狂抑郁症)病人，可诱发躁狂相。服用本品不宜驾车辆和操纵机器等。心血管病、糖尿病、甲亢、肝肾疾病患者及有癫痫史的病人慎用。本品久服骤停，可能出现撤药反应如恶心呕吐、头痛眩晕、失眠多梦、甚至心律失常、出现锥体外系症状和急性精神障碍等。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)