

吡那地尔 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/311/2021\\_2022\\_\\_E5\\_90\\_A1\\_E9\\_82\\_A3\\_E5\\_9C\\_B0\\_E5\\_c22\\_311566.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E5_90_A1_E9_82_A3_E5_9C_B0_E5_c22_311566.htm) 药品名称吡那地尔药物别名 (Pinac) 英文名称Pinacidil [ ] 类别降血压药适应症本品为钾通道开放药。它使平滑肌细胞的钾通道开放，导致钾外流和静止膜电位负向转移，使静息时的细胞超极化，最后的效应是细胞内Ca<sup>2+</sup>减少和平滑肌松弛，外周血管扩张，阻力下降，血压下降。可引起反射性心率增加。口服后吸收迅速，1小时后血药浓度达峰值；与血浆蛋白结合率约50%；生物利用度约60%。在肝内代谢，代谢物仍具降压作用。本品及其代谢物的t<sub>1/2</sub>约3小时。口服片剂，降压作用可维持6小时；口服其缓释胶囊，降压作用可持续12小时。不良反应其不良反应主要是水肿，尤其在服用大剂量时更易发生。其他不良反应为头痛、心悸、心动过速、乏力、位置性低血压、鼻塞等。用法用量主要用于高血压，口服，1次25mg，1日2次。常用其缓释胶囊，每胶囊12.5mg；25mg；37.5mg。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)