

盐酸酚苄明 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/311/2021\\_2022\\_\\_E7\\_9B\\_90\\_E9\\_85\\_B8\\_E9\\_85\\_9A\\_E8\\_c22\\_311594.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E7_9B_90_E9_85_B8_E9_85_9A_E8_c22_311594.htm) 药品名称盐酸酚苄明  
药物别名苯苄胺，苯氧苄胺、竹林胺 Dibenzyline 英文名  
称Phenoxybenzamine Hydrochloride 类别 受体阻断药制剂片  
剂：10mg；注射液：1ml：10mg、2ml：100mg。药理毒理为  
受体阻断药。作用似酚妥拉明，但较持久，1次用药可维  
持3~4日。药动学体位性低血压、心动过速、鼻塞、瞳孔缩  
小、眩晕。亦有神志模糊、口干、射精障碍、倦怠、晕厥、  
休克、恶心、呕吐等。适应症不宜手术的嗜铬细胞瘤。四周  
血管痉挛疾病。不良反应减弱(受体激动剂的作用而加剧(受  
体阻滞药的作用(低血压、心动过速)。用法用量口服，成人  
，10mg/次，2次/日，隔日增加10mg至取得疗效，维持剂  
量20mg~40mg/次，2次/日。儿童，一次0.2mg/kg，1次/日，  
每隔4日增量至取得疗效，维持每日0.4mg~1.2mg，分3~4次  
，不宜超过10mg/次。静脉滴注，成人，1mg/kg注重事项娠C  
类。休克禁用。脑血供不足、代偿性心力衰竭、冠心病、肾  
功能不全慎用。与食物同服可减少胃肠道不良反应。应定期  
测量血压和心率。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接  
下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)