

硫酸双肼屈嗪 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/311/2021\\_2022\\_\\_E7\\_A1\\_AB\\_E9\\_85\\_B8\\_E5\\_8F\\_8C\\_E8\\_c22\\_311599.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E7_A1_AB_E9_85_B8_E5_8F_8C_E8_c22_311599.htm) 药品名称硫酸双肼屈嗪  
药物别名双肼苯哒嗪，双肼酞嗪，血压达静 Nepressol 英文名称Dihydralazine Sulfate 类别降血压药制剂片剂：12.5mg、25mg。复方降压片，每片含硫酸双肼屈嗪4.2mg，利舍平32(g，氢氯噻嗪3.1mg，氯氮卓2mg，盐酸异丙嗪2.1mg，氯化钾30mg，维生素B11mg，维药动学口服首过效应明显，Tmax约1~2h。适应症轻、中度高血压。不良反应心悸、心动过速、心绞痛、充血性心衰、恶心、呕吐、腹泻；严重时  
有头痛、眩晕、忧郁、焦虑、震颤、四周神经炎及药热和皮疹。长期大量应用可引起类风湿关节炎或全身性红斑狼疮样综合征，骨髓抑制现象。相互作用与利舍平、利尿药合用有协同作用。用法用量单独口服，成人，12.5mg~25mg/次，3~4次/日。根据疗效酌加，不宜超过150mg/日。目前多以复方应用于临床，不同厂家组成、剂量有所不同，应予以注重。注重事项妊娠、哺乳期妇女慎用。肝肾功能不全、脑血管病、心绞痛、心肌梗死、慢性充血性心力衰竭患者慎用。  
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)