

盐酸哌唑嗪 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E7_9B_90_E9_85_B8_E5_93_8C_E5_c22_311609.htm 药品名称盐酸哌唑嗪
药物别名Minipress 英文名称Prazosin Hydrochloride 类别 受体阻断药制剂片剂：1mg、2mg。药理及应用药理毒理本品为选择性突触后 α_1 -受体阻滞剂，使外周血管阻力降低，产生降压作用。对冠状动脉有扩张作用，对肾血流影响较小。药动学口服吸收完全，PB92%~97%，T_{max}约1~3h，2h起效，持续约10h。主要在肝内代谢，T_{1/2}约2~3h，老年或充血性心力衰竭患者延长。适应症轻、中度高血压，常与利尿药合用。也用于充血性心力衰竭、麦角胺过量。不良反应体位性低血压反应(首剂反应)，眩晕、头昏，血容量小或限钠过分、老年患者甚至可昏倒，体温过低。亦有视力模糊、幻觉、头痛、忧郁、易激动、便秘、腹泄、口干、恶心、呕吐、鼻塞、尿频等。相互作用钙拮抗药等抗高血压药可增强本品作用。拟交感胺药物、非甾体类消炎镇痛药可减弱本品降压作用。用法用量剂量个体化。口服，成人，首剂0.5mg~1mg，根据血压调整剂量，一般为6mg~15mg/日，2~3次/日。合用其它药物一般2mg~6mg/日，2~3次/日。儿童，0.25mg~0.5mg/次，2~3次/日，按临床疗效调整剂量。注重事项妊娠C类。妊娠、哺乳期妇女慎用。高血压合并高血脂者选用本品为宜。首剂或加大剂量宜就寝前服用。本品过量所致循环障碍，须补充血容量、给予拟交感胺药物。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com