

盐酸肼屈嗪 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E7_9B_90_E9_85_B8_E8_82_BC_E5_c22_311611.htm 药品名称盐酸肼屈嗪
药物别名肼苯哒嗪，肼酞嗪 Apresoline 英文名称Hydralazine
Hydrochloride 类别降血压药制剂片剂：10mg、25mg、50mg、
100mg；注射液：1ml：20mg。药动学口服Tmax约1h，PB
约85%，20～30min起效，持续2～4h。肌肉注射5～20min起效
，持续2～6h。首过效应明显，肝内代谢，肾脏排泄。T1/2
约2h。适应症中度慢性高血压。不良反应头痛、眩晕心悸、
面红、心动过速、心绞痛、恶心、腹泻、寒颤、发热、皮疹
等。亦可致水钠潴留，长期大剂量可引起类风湿性关节炎和
红斑狼疮综合征。相互作用利尿药、阻滞药、单胺氧化酶
抑制剂等抗高血压药可增强本品作用，非甾体消炎镇痛药可
降低本品作用。用法用量口服，成人，10mg/次，3～4次/日
，每2～5日增量，不宜超过200mg/日。儿童，每日0.75mg
～1mg/kg，2～4次/日，不宜超过25mg/次，缓慢增加，一般
每日1mg～5mg/kg，不宜超过150mg/日。肌肉注射或静脉注射
，成人，10mg～20mg/次，4～6次/日，血压控制后改为口服
。注重事项妊娠C类。妊娠、哺乳期妇女禁用。冠状动脉病
变、脑血管硬化、心动过速、心绞痛及对本品过敏者患者禁
用。静脉注射应缓慢。100Test 下载频道开通，各类考试题目
直接下载。详细请访问 www.100test.com