

海捷亚 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E6_B5_B7_E6_8D_B7_E4_BA_9A_c22_311670.htm 药品名称海捷亚 英文名称Hyzaar 类别降血压药制剂片剂分子式成分每片片剂：氯沙坦钾 losartan K 50 mg，. 氢氯噻嗪 hydrochlorothiazide 12.5 mg 药理毒理已证实本药的成分对降低血压有相加作用，比两种成分单独降低血压幅度更大。这是因为氯沙坦钾和氢氯噻嗪具有协同作用。而且，作为利尿作用的结果，氢氯噻嗪增加血浆肾素活性，增加醛固酮分泌，降低血钾，增加血管紧张素 水平。氯沙坦钾阻断所有与血管紧张素 有关的生理作用，并通过抑制醛固酮而减弱与利尿剂有关的钾丢失。已证实氯沙坦钾有稍微和暂时的促尿酸尿作用。氢氯噻嗪可引起尿酸的轻度升高；氯沙坦钾和氢氯噻嗪合用可减轻利尿剂所致的高尿酸血症。氯沙坦钾和氢氯噻嗪合用时，抗高血压作用加强。本药的抗高血压作用可持续24小时。在为期至少一年的临床研究中，本药仍能保持抗高血压作用。本品虽然明显降低血压，但对心率无临床意义的影响。临床试验中，氯沙坦钾50 mg/氢氯噻嗪12.5 mg治疗12周后，坐位舒张压的谷值平均降低13.2 mmHg。在一项比较氯沙坦钾50 mg/氢氯噻嗪12.5 mg和卡托普利50 mg/氢氯噻嗪25 mg对年轻（lt.65岁）和老年（ 65岁）患者均能有效降低血压，并对各种程度的高血压均有效。适应症治疗高血压，适用于联合用药治疗的患者 不良反应在氯沙坦钾- 氢氯噻嗪的临床试验中，未发现这种复方药物有非凡的不良反应，只限于那些以前报道过的氯沙坦钾和/或氢氯噻嗪的不良反应。这种复方制剂不良反应的总体发生率与安慰剂相似，中断治疗的百分率也与安慰剂

相似。一般而言，用氯沙坦钾- 氢氯噻嗪治疗的耐受性良好，大多数不良反应的性质稍微和短暂，不需中断治疗。氯沙坦钾- 氢氯噻嗪治疗原发性高血压的临床对照试验中，头晕是唯一被报道发生率高于安慰剂1%或以上的药物不良反应。上市后发现的其它不良反应：过敏 - 氯沙坦钾治疗的患者中很少有血管神经性水肿(包括喉和声门肿导致呼吸道堵塞和/或脸、唇、咽和/或舌的肿胀)的报道，其中一些患者曾因服用其它药物(如ACE抑制剂)而出现血管神经性水肿。胃肠道 - 肝炎(在使用氯沙坦钾患者中罕见报道)，腹泻。实验室化验结果 - 在临床对照试验中，标准实验室参数发生临床重要改变者极少与服用本药有关。有0.7%患者发生高血钾(血钾#091. 用药过量lt. 30 mL/分lt. 65岁)和老年(>65岁)患者的疗效和安全性无临床显著差异。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com