

甲磺酸酚妥拉明 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E7_94_B2_E7_A3_BA_E9_85_B8_E9_c22_311671.htm 药品名称甲磺酸酚妥拉明 药物别名立其丁、瑞支亭、雷吉亭、酚胺唑啉、甲磺酸苄胺唑啉 Regitine 英文名称Phentolamine Mesylate 类别 受体阻断药 制剂注射液：1ml：5mg、1ml：10mg。 药理毒理本品为 α -受体阻断药，通过阻断 α -受体和间接激动 α -受体，迅速使四周血管扩张，可显著降低外周血管阻力，增加四周血容量，改善微循环。本品对心脏有兴奋作用，使心肌收缩力增加、心率加快、心输出量增加。 药动学 肌内注射Tmax 约20min，作用持续30~45min。静注后2~5min起效，持续15~30min。T1/2约19min。 适应症 预防和治疗嗜铬细胞瘤所致的高血压及高血压危象。局部浸润注射防止去甲肾上腺素外溢所致局部组织坏死的发生，外周血管痉挛性疾病及血栓闭塞性脉管炎。偶用于嗜铬细胞瘤的诊断。 不良反应 体位性低血压、心动过速或心律失常、心绞痛。亦有鼻塞、腹痛、恶心、呕吐等。罕见胸痛(心肌梗死)、神志模糊、共济失调等。 相互作用 拟交感胺类药可减弱本品作用；与胍乙啶同用极易发生体位性低血压或心动过缓；可减弱二氮嗪抑制胰岛素释放的作用。降压药、苯巴比妥类药等可干扰本品诊断结果。 用法用量 用药期间饮酒可出现双硫仑反应。嗜铬细胞瘤手术，成人，术前静注5mg，术时静注5mg或静滴0.5mg~1mg/min。儿童，术前和术中各静注1mg或0.1mg/kg。 诊断试验，静脉注射，成人，5mg/次。儿童，1mg/次。 高血压危象，成人，5mg~20mg。去甲肾上腺素外溢，5mg~10mg加

入10ml氯化钠注射液中局部浸润。防止皮肤坏死，1%静脉滴注。血管痉挛性疾病，肌注或静滴，5mg~10mg，必要时重复。注重事项妊娠C类。严重动脉硬化、肾功能不全、胃炎、消化道溃疡及冠心病患者禁用。老年人易诱发低体温。本品仅用于循环中儿茶酚胺过多引起的高血压。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com