

酚苄明 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E9_85_9A_E8_8B_84_E6_98_8E_c22_311683.htm 药品名称酚苄明 英文名称phenoxybenzamine 类别 受体阻断药性状常用其盐酸盐，为白色或类白色结晶性粉末；无臭，几乎无味。在乙醇或氯仿中易溶，在水中极微溶解。制剂片剂：每片10mg。注射液：每支10mg（1ml）。药理及应用为 1、 2阻断剂。作用似酚妥拉明，但较持久，用药1次可持续3~4日。可用于四周血管疾病，也可用于休克及嗜铬细胞瘤引起的高血压。本品可阻断 受体而抑制输精管、精囊及射精管的蠕动，使精液不排入尿道，从而使射精的副交感神经刺激延迟，因而性交时间延长，可用于治疗早泄。用法用量口服：用于血管痉挛性疾患，开始时每日1次10mg，1日2次，隔日增加10mg；维持量，1次20mg，1日2次。用于早泄，1次10mg，1日3次。静注：每日0.5~1mg/kg。静滴（抗休克）：0.5~1mg/kg，加入5%葡萄糖液250~500ml中静滴（2小时滴完），1日总量不超过2mg/kg。注重事项（1）可有竖立性低血压、心动过速、瞳孔缩小、鼻塞、口干等。（2）肾、冠脉功能不全及脑血管病患者慎用。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com