

地尔硫卓 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E5_9C_B0_E5_B0_94_E7_A1_AB_E6_c22_311686.htm 药品名称地尔硫卓药物别名硫氮酮，哈氮，CRD401，Dilthiazem，HERBESSER 英文名称Diltiazem 类别钙拮抗药性状常用其盐酸盐，为白色或类白色的结晶或结晶性粉末；无臭、味苦。在水、甲醇或氯仿中易溶，在乙醇或苯中不溶。熔点：210～215（分解）。制剂片剂；每片30mg。缓释片剂：每片30mg。分子式成分药理及应用为苯噻氮类钙拮抗剂。它对心脏的电生理效应与维拉帕米类似，能阻断去极化的蒲氏纤维放电，并消除电去极的心室肌的自动节律性，抑制房室结传导及延长其不应期。其直接减慢心率的作用较强。可扩张冠状动脉及外周血管，使冠脉流量增加和血压下降。可减轻心脏工作负荷及减少心肌耗氧量，解除冠脉痉挛。口服后吸收迅速完全，30分钟血药浓度达峰值， $t_{1/2}$ 约4小时。在血浆中与蛋白结合率为80%，由肝灭活约65%。可用于室上性心律失常，典型心绞痛、变异型心绞痛，老年人高血压等。用法用量口服，常用量，1次30～60mg，1日90～180mg。用于心律失常：1次30～60mg，1日4次。用于心绞痛：每6～8小时30～60mg。用于高血压，1日剂量120～240mg，分3～4次服。注重事项（1）服药时不能嚼碎。（2）对有Ⅱ度以上房室阻滞或窦房阻滞患者以及孕妇禁用。（3）如出现头痛、头晕、疲惫感、心动过缓等症状时应减少剂量或停用。有时还会出现胃部不适、食欲不振、便秘或腹泻等。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com