

异克舒令 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/311/2021\\_2022\\_\\_E5\\_BC\\_82\\_E5\\_85\\_8B\\_E8\\_88\\_92\\_E4\\_c22\\_311687.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E5_BC_82_E5_85_8B_E8_88_92_E4_c22_311687.htm) 药品名称异克舒令 英文名称Isoxsuprine [ ] 类别 受体阻断药制剂常用其片剂

，每片10mg；20mg。其注射液为10mg（2ml）。药理及应用本品具有阻断 受体及激动 受体的作用，也具有直接舒张血管平滑肌及子宫平滑肌的作用。故可舒张脑血管、骨骼肌血管及皮肤血管，也有正性肌力效应。口服后吸收良好。给药后1小时达血药浓度峰值。t<sub>1/2</sub>为1.5小时。不良反应不良反应有瞬时皮肤潮红及胃肠功能失常。大剂量可致心率加快及低血压。罕见皮疹。用法用量临床用于治疗脑血管及外周血管痉挛性疾病。口服，1次20mg，1日4次；肌注，1次10mg，1日3次。也可用于防止早产。开始时静脉滴注，200~300 μg /分，可视反应渐增至500 μg /分。用药时需监护孕妇的血压、心率以及胎儿的心率；随后可肌注，第1天每3小时10mg；第2~3天每4~6小时10mg；然后再继以口服，40~80mg /日，分次服。注重事项近期出血者禁用。心脏病及贫血患者不宜注射给药。伴有感染的早产不宜应用。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)