

盐酸溴己新 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E7_9B_90_E9_85_B8_E6_BA_B4_E5_c22_311721.htm 药品名称盐酸溴己新
药物别名溴己铵，溴苄环己铵，必嗽平、盐酸溴己新、必消痰、必漱平、溴苄环己胺 Bisolvon 英文名称Bromhexine Hydrochloride 类别祛痰药制剂片剂：4mg、8mg；注射液：1ml:2mg、1ml:4mg。 药理毒理本品可直接作用于支气管腺体，促使粘液分泌细胞的溶酶体释出，使痰中的粘的糖纤维分化裂解；还可抑制粘液腺和杯状细胞中酸性糖蛋白的合成，使之分泌粘滞性较低的小分子糖蛋白，从而使痰液的粘稠度降低，易于咳出。此外，还可刺激胃粘膜反射性地引起呼吸道腺体分泌增加，使痰液稀释。 药动学口服后1h见效，3~5h作用最强，可维持6~8h。大部分随尿排泄。适应症支气管炎、哮喘、肺气肿等粘痰不易咳出。 不良反应偶有恶心、胃部不适、血清转氨酶有暂时升高等。 相互作用与四环素合用，能增加支气管分泌液中四环素的浓度。 用法用量口服：成人8mg~16mg/次，3次/日。肌注：4mg~8mg/次，1~2次/日。静脉推注：4mg~8mg/次，1~2次/日。静脉滴注：8mg/次，1次/日。 注重事项胃溃疡病人慎用。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com