

酚妥拉明 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E9_85_9A_E5_A6_A5_E6_8B_89_E6_c22_311722.htm

药品名称酚妥拉明
英文名称Phentolamine 类别 受体阻断药性状常用其甲磺酸酯

(phentolamine mesylate) ，为白色或类白色结晶性粉末；无臭，味苦。在水或乙醇中易溶，在氯仿中微溶。熔点176

~ 181 。制剂注射液：每支5mg (1ml) ；10mg (1ml) 。片剂：每片25mg。分子式成分药理及应用为 1、 2阻滞剂，

有血管舒张作用。临床上用于血管痉挛性疾病，如肢端动脉痉挛症（即雷诺氏病）、手足发绀症等、感染中毒性休克以及嗜铬细胞瘤的诊断试验等。用于室性早搏亦有效。贮存须避光避潮湿，贮于干燥阴凉处。用法用量（1）治血管痉挛性疾病 肌注或静注，每次5 ~ 10mg，20 ~ 30分钟后可按需要重

复给药。（2）抗休克以0.3mg / 分钟的剂量进行静滴。（3）室性早搏开始两天，每次口服50mg，1日4次，如无效，则以后两天，将剂量增加至每次75mg，1日4次，如仍无效，可增至1日400mg，如再无效，即应停用。不论何种剂量，一旦有效，则按该剂量继续服用7日。（4）诊断嗜铬细胞瘤 静注5mg，注后每30秒钟测血压1次，可连续测10分钟，如在2 ~ 4分钟内血压降低4.67 / 3.33kPa (35 / 25mmHg) 以上时为阳性结果。（5）作阴茎海绵体内注射，可使阴茎海绵窦平滑肌松弛、扩张而勃起，可用于治疗阳萎，1次注射1mg。注重事项（1）副作用有竖立性低血压、鼻塞、瘙痒、恶心、呕吐等，低血压、严重动脉硬化、心脏器质性损害、肾功能减退者忌用。（2）忌与铁剂配伍。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com