

米安色林 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E7_B1_B3_E5_AE_89_E8_89_B2_E6_c22_311729.htm 药品名称米安色林药

物别名米塞林，甲苯吡，美安适宁，Bolvidon，Organon

，Norval，Bencard 英文名称Mianserin 类别抗抑郁症药性状常

用其盐酸盐、盐酸米安色林为白色或带黄白色的结晶性粉末

，无臭，易溶于甲醇、氯仿，略溶于水或无水乙醇，几乎不

溶于甲苯。制剂片剂：每片10mg；30mg。分子式成分药理及

应用本品为四环类抗抑郁药，抗抑郁作用与丙米嗪或阿米替

林相似，但其抗胆碱作用比后者小。其抗抑郁作用机制为抑

制突触前膜上的 α_2 受体，促进NA释放，并阻断脑内5-HT受

体。本品还具有与地西洋相似的抗焦虑作用。在外周，可对

抗组胺和5-HT的作用，但无抗胆碱作用。对心血管的作用小

，很少引起低血压为其重要优点。由于抗胆碱副作用小，老

年人和心脏病患者易于耐受。本品口服易吸收，2~3小时达

血药峰浓度。口服的生物利用度较低，约为30%。可能有首

过效应。可分布全身，易透过血脑屏障。血浆蛋白结合率

为90%。经肝脏代谢，代谢产物及少量原形（约4%~7%）

自肾排出。血浆 $t_{1/2}$ 为10~17小时。本品适用于抑郁症的治疗

，非凡适合伴有心脏病（包括最近患有缺血性心脏病的患者

）的抑郁症患者或正在应用有关药物治疗的抑郁症患者。与

阿米替林比较，阿米替林对激动症状、性欲、记忆力、自杀

意念的改善较好；而本品则对思维迟钝、运动性抑制、自责

自罪及自杀念头的改善更好，本品30~60mg的疗效约与阿米

替林75~150mg相等。本品亦可用于治疗原发性焦虑症或伴

有抑郁症的焦虑症。用法用量口服：成人，初期用药天

天30mg，然后根据病情调整剂量，通常剂量范围为天天40~80mg，对多数病人天天60mg已足够。对住院病人可用至天天120mg，睡前1次服或白天分次服用。注重事项（1）本品副作用少而轻，大剂量时有困倦、疲惫、失眠、口干、便秘、焦虑等症状。（2）有青光眼、排尿困难、癫痫病史、痉挛病史、脑部器质性病变者以及未控制的糖尿病患者、老年人、儿童慎用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com