

托洛沙酮 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/311/2021\\_2022\\_\\_E6\\_89\\_98\\_E6\\_B4\\_9B\\_E6\\_B2\\_99\\_E9\\_c22\\_311734.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E6_89_98_E6_B4_9B_E6_B2_99_E9_c22_311734.htm) 药品名称托洛沙酮药

物别名Humoryl，Perenum 英文名称Toloxatone 类别抗抑郁症药制剂胶囊剂：每胶囊0.2g。分子式成分药理及应用本品为一具有新型结构的抗抑郁药，其作用机制为选择性地抑制MAO-A活性，从而阻止5-HT和NA的代谢，产生抗抑郁作用。其对MAO-A的选择性抑制作用是可逆的。本品与食物及其它药物无相互作用，可与各种药物配合使用。口服后吸收迅速，经30～60分钟达峰浓度。体内代谢快，最后自尿中排出，以代谢产物为主，原形仅有5%～10%。适用于治疗神经官能性抑郁症、神经质和非神经质性抑郁、退化性抑郁症、躁狂抑郁性精神病患者的抑郁症发作。亦可用于精神病的抑郁或痴呆期。用法用量口服，每次200mg，每日3次，饭时服。注重事项（1）偶见消化不良、恶心、呕吐、头痛、头晕等，精神病患者可出现谵妄。（2）禁止与其他MAOI合用。（3）与其它抗抑郁药一样，应在停用其他MAOI后隔15～20日才可用本品。（4）躁狂症与谵妄患者禁用。孕妇慎用。（5）本品有脱抑制作用，故对精神分裂症患者使用时，应非凡注重监护。（6）应用本品应注重血压的变化。（7）用药期间不应饮用含酒精的饮料。（8）全麻情况下，须停药6个小时以上方可用药。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)