

曲唑酮 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/311/2021\\_2022\\_E6\\_B2\\_E5\\_94\\_91\\_E9\\_85\\_AE\\_c22\\_311740.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022_E6_B2_E5_94_91_E9_85_AE_c22_311740.htm) 药品名称曲唑酮 英文名

称Trazodone 类别抗抑郁症药制剂片剂：每片50mg；100mg。

分子式成分药理及应用曲唑酮是三唑吡啶类抗抑郁药，其抗抑郁作用相似于三环类和MAOI，但对心血管系统毒性小，无抗胆碱副作用，较适用于老年或伴有心血管疾病的抑郁症病人。抗抑郁作用机制是选择性地阻断5-HT的再吸收，并可有微弱的阻止去甲肾上腺素重吸收的作用，但对多巴胺、组胺和乙酰胆碱无作用，亦不抑制脑内MAO的活性。本品还具有中枢镇静作用和稍微的肌肉松弛作用，但无抗痉挛和中枢兴奋作用。本品对心脏无影响，但能引起血压下降，此作用与剂量相关。口服吸收良好，2小时达高峰浓度。与食物同服，可推迟其吸收，并使其吸收量降低。吸收后较多分布于肝、肾中，经肝脏代谢，其代谢产物仍有明显的活性。本品与其代谢产物均易透过血脑屏障，但少进入胎儿体内。代谢产物最后经肾脏排出，很少以原形排出（只有1%），肾功能损伤不影响其排泄。t<sub>1/2</sub>平均为4.1小时。临床可用于治疗抑郁症，顽固性抑郁症患者经其它抗抑郁药治疗无效者，用本品往往有效。还可用于治疗焦虑症，尤适用于治疗老年性抑郁症或伴发心脏疾患的病人。用法用量口服：本品应从小剂量开始，逐渐增加剂量。一般成人开始每日用50～100mg，分次服，3～4天内，每日剂量可增加至50mg，最大剂量门诊病人可达每日400mg，住院病人可达600mg。不推荐将此药用于18岁以下儿童和少年。老年人从每次25mg开始，每日2次，经3～5天逐渐增加至50mg，每日3次，很少超过每日200mg。

注意事项（1）副作用较少而稍微。最常见的不良反应是倦睡，偶见皮肤过敏、视力模糊、便秘、口干、高血压或低血压、心动过速、头晕、头痛、腹痛、恶心、呕吐、肌肉痛、震颤、协同动作障碍。（2）癫痫患者、肝肾功能不良者慎用。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)