

酮色林 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/311/2021_2022__E9_85_AE_E8_89_B2_E6_9E_97_c22_311741.htm 药品名称酮色林药物别名（酮舍林，凯坦色林，Ritanserlin，Sufrexal，Serefrex 英文名称Ketanserin〔 〕类别降血压药制剂片剂：每片20mg；40mg。注射液：5mg（1ml）；10mg（2ml）；25mg（5ml）。分子式成分药理及应用本品为5-羟色胺受体阻断药，对5HT₂受体有选择性阻滞作用，亦有较弱的 α_1 和H₁受体拮抗作用。有降低高血压患者的外周阻力，肾血管阻力的下降更明显，对正常人无降压作用。对有阻塞性血管病变者，可改善下肢血流供给。对雷诺病者可改善组织的血流灌注、使皮肤血流增加。静脉注射后可降低右房压、肺动脉压及肺毛细血管模压。口服吸收迅速完全，0.5~2小时血药浓度达峰值。与血浆蛋白结合率95%。生物利用度约50%。在肝内代谢。t_{1/2}约15小时。食物不影响其吸收。用于各型高血压，也用于充血性心力衰竭，雷诺病及间歇性跛行。不良反应有头晕、疲乏、浮肿、口干、体重增加及Q-Tc延长（易发生于低血钾时）。不宜与排钾利尿药合用。用法用量口服，开始剂量1次20mg，1日2次。1个月后如疗效不满足，可将剂量增至1次40mg，1日2次，剂量超过40mg时，降压作用不再增强。肝功能不全时，1次剂量勿超过20mg。静脉注射的开始剂量为10mg，最大剂量为30mg，以每分钟3mg的速度注射。也可静脉滴注，滴速2~6mg/小时。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com